

Protocole gale pour CAES en région ARA

Contamination

- Directe : contacts rapprochés et prolongés
- Indirecte : par l'intermédiaire des tissus (vêtements, linge, literie...)

Traitement : toutes les étapes sont réalisées 2 fois à 8 à 14j d'intervalle

Traitement des cas et contacts simultanément

- Ongles courts et brossés
- Traitement oral : Ivermectine (Stromectol) en prise unique, posologie selon le poids
 - Le matin entre 2 repas (à jeun 2h avant et 2h après) : prise du traitement
 - Le soir :
 - douche, lavage au savon, rinçage abondant, séchage avec une serviette propre
 - mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres
 - Le lendemain, après le traitement de l'environnement
 - douche, lavage au savon, rinçage abondant, séchage avec une serviette propre
 - mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres (donc 2 fois en 24h)
- Traitement local en complément si gale profuse :
Badigeon d'un produit scabicide (crème, spray ou lotion) : Ascabiol, Spregal, Topiscab...
 - douche le soir : lavage au savon, rinçage, séchage sommaire avec une serviette propre
 - appliquer le produit sur la peau encore humide par badigeonnage au pinceau sur l'ensemble du corps sauf visage en insistant sur les plis
 - mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres
 - laisser agir en général 24h (selon notice du produit)
 - rincer abondamment sous la douche
 - se sécher avec une serviette propre
 - mettre des sous-vêtements/vêtements/draps propres (donc 2 fois en 24h)
- Absence de contact physique pendant 48h en changeant si possible encore de vêtements à J2

Traitement de l'environnement le lendemain matin

- Linge, draps, taies, serviettes de toilette... utilisés dans les 3 derniers jours (8j si gale profuse)
 - Laver en machine à 60°C
 - OU stoker dans un sac plastique avec produit acaricide > 3h, rincer ou secouer et aérer > 12h
 - OU stoker dans un sac plastique à T° ≥ 21°C pendant au moins 3j (8j si gale profuse)
 - OU exposition > 15 min à plus de 50°C ou > 2h à -25°C ou une nuit à -20°C
- Locaux et surfaces dures, non absorbantes : détergent-désinfectant classique
- Matelas, sommiers et autres mobiliers absorbants si gale profuse ou hyperkératosique :
 - Traitement
 - Spray acaricide ([Ascaflash](#), Baygon vert, Ethos 30 EC, Ront Production...) : selon recommandations du fabricant, aérer pendant et après traitement
 - OU exposition > 15 min à plus de 50°C ou > 2h à -25°C ou une nuit à -20°C
 - Prévention possible : protection par une housse imperméable (type alaise)

Protection des intervenants

- Equipements de protection individuelle : surblouse manches longues et gants
- Après retrait des gants : lavage des mains à l'eau et au savon (action mécanique nécessaire) puis séchage puis friction avec une solution hydro-alcoolique